Guia de Parteiras.

por perguntas e Res=
postas.

// ——— // ——— //

P. — Que Conhecim.tos São nessecarios á Parteira, p.ª bem asistir ao parto?

R. — Deve ser bem instruida na Theoria, e na pratica do Officio de partejar.

P. — Em q̃ Consiste a Theoria?

R. — Em dar Regras, e perceitos Certos p.ª bem Manejar o parto.

P. — Em q̃ Consiste a Pratica?

R. — Em ajudar a Parturiente no trabalho de parir, &.ª

P. — Quaes São as Regras, e os perceitos da Theoria?

R. — Conhecer os ossos da Bacia, grandes Labios, Forcheta, Madre, ou Utero: e de Conhecer pela vesita a dilatação do Orificio da=

2.ª

Madre e aposição da Criança, tanto na prenhez, como no= parto.

P.— Quaes são os Ossos da Bacia?

R.— São quatro na idade adulta; e na infancia cada hum se= devide em mais Ossos.

P.— Quaes são os quatro Ossos?

R.— Sacro, Coxis, e dois Ossos das= Cadeiras, ou Ilhargas.

P.— Em quantos se devide cada hum dos quatro na infancia?

R.— Cada hum dos Ossos das Ca= deiras se devide em tres: Ilion, Ischion, e Pubis. O Sacro de quatro, ou sinco: e o Coxis, de tres Ossos.

P.— Em que lugar estão estes Ossos?

R.— O Sacro está na parte detras, o=

o Coxis por baixo do Sacro: os Ossos das Cadeiras Ilion, e Ischion aos lados, e os Pubis na parte de diante da Bacia.

P. — Que uso tem estes Ossos?

R. — De alojarem as partes da geração da Mulher, e as partes adjacentes, contentos da preñez, fazerem pela sua união huã Cavidade aberta, q̃ dá sahida á Criança no parto, e o Coxis de desviar para tráz na passagem da Criança.

P. — Que nome se dá a esta Cavidade aberta?

R. — Pela figura que tem de huã bacia sem fundo, lhe chamão Bacia.

P. — Que partes se devem conhecer da Bacia?

R. —

4.ª R. — Trez: entrada, Cavidade, e Sahida.

P. — Qual he a entra, e Sahida da Bacia?

R. — A entrada he a abertura mais alta, e a Sahida a abertura mais baixa.

P. — Qual he a Cavidade da Bacia?

R. — He todo o espaço Compre=endido entre as duas a=berturas.

P. — Que proporção deve ter a Bacia bem Conforma=da?

R. — A entrada mais alta, deve ter a largura dos Pu=bis ao Sacro de quatro pole=gadas, e meia; a largura de hum lado ao outro da=

de sinco polegadas, emeia: a=
altitude á largura da Cabeça
dos Pubis aos Coxis quatro polega=
das emeia; edehum lado ao Ou
tro quatro polegadas.

P. — Que porporçoens deve ter a Cavidade?

R. — Deve ter tres profundidades; pro
fundidade de diante deduas po=
legadas: profundidade dos lados
detres polegadas, emeia: eprofun
didade detrás desinco polegadas.

P. — Quando a Bacia naõ tiver es=
tas proporçoens, q nome se=
lhe dá?

R. — Chamasse Bacia mal conforma
da.

P. — Deq formas he a Bacia mal con=
formada?

R. — Deduas: por aperto, eporaumento.

Por.

6.ª

Por aperto, quando as larguras diminuem. Por aumento, qd.º as larguras excedem hes suas proporçoens.

P. _ Quando a Bacia he apertada, o q pode acontecêr?

R. _ Parto laborioso.

P. _ Q.do a Bacia fôr m.te larga, que acontecerá?

R. _ Parto precipitado.

P. _ O q são grandes labios?

R. _ São duas pregas de pele, q formão as parte chamadas naturaes.

P. _ Que tem de particular os grandes labios?

R. _ Exteriorm.te a sua pele he aspera, cuberta de cabelos; interiorm.te a pele he lisa,

macia

Macia, Vermelha, abu=
nida, com terem durera.

P. – Conservão-se os grandes labios
nesta consistencia?

R. – Não se conservão, senão na
Virgem, a saber: fora da=
Virgindade perdem a sua
durera: os cabellos cahem
com as prenheres; o seu inte
rior perde a côr Vermelha,
Vem a scura; o liso, e macio
Vem á aspero, e Sem Seccos.

P. – O q̃ he Forchete?

R. – He hũa prega, q̃ une em baixo
os grandes labios.

P. – Que usos tem estas partes
nos Partos?

R. – De se dilatarem, ou estende
rem com a comprerção =

8.

da Criança, lhe daram passagem.

P. — O q̃ he Perineo?

R. — He o espaço q̃ esta entre as duas virilhas.

P. — Que attenção merece no parto o Perineo?

R. — Defendelo de se rasgar, e a forculheta tão bem.

P. — Como se poderá prevenir este accidente?

R. — Logo q̃ a Cabeça da Criança, comprimindo o Perineo, levanta hũ tumor, põe-se a palma da Mão sobre este, e carrega-se com força em cada dôr até q̃ a cabeça saia fora da Vulva.

P. — O q̃ he intestino Recto?

R. —

R. — He a ultima porcaõ dos Intes-
tinos, q acaba no anûs, por on-
de sahe as fezes.

P. — O q he Bexiga urinaria.?

R. — He hum saco Membranoso
semilhante a huã garrafa em-
borcada com o fundo p.a sima,
e a boca p.a baixo.

P. — Que utilidades praticas se tirao
no parto de conhecer o Intestino
Recto e Bexiga Urinaria.

R. — De os despejar dos seus contentos
q. estiverem cheios no principio
do parto a fim e naõ embara-
çarem.

P. — O q he Vagina.?

R. — He hum Canal q commua nos
grandes labios, e termina no ori-
ficio do Utero, abraçando o
por hua intima uniaõ.

P. —

10. P. — Que comprim.to e largura tem a Vagina.

R. — De comprim.to tem seis até sete pollegadas, e de largura até tres.

P. — De q. se compõem a Vagina.

R. — De Membrana, e de rugas capazes de grande dilata=ção no parto.

P. — Que se encontra na entrada da Vagina.

R. — Hum Circulo a que chamão se=melhante a hum anel, que se abre, e fecha chamado esfincter, o qual he o ori=ficio da Vagina, e as Virgens se acha tapado por huma Membrana chamada Himen, que faz a Virgindade.

P. — Que he Madre ou Utero.

R. — He huma entranha oca si-

defigura dehuã peira oregarça
xatanka; a Sua parte Mais
larga esta p.r Sima, emais e=
treita p.a baixo Metida den=
tro daVagina.

P. —Dequantas partes secompoem
a Madre.

R. —Detres; fundo, Corpo, epescoço.

P. —Quaes São estas partes.

R. —Ofundo he apartte Mais
larga esta Mais alto: o=
Corpo he Mais delgado, es=
ta abaixo do fundo: Opescoço
he a parte Mais delgada,
esta abaixo do Corpo Meti
do na Vagina.

P. —Oq he orificio da Madre.

R. —Hé huã abertura q fica no
fim do Seu pescoço.

P.—

P. — Que lados tem a Placenta.

R. — Dois, hum corresponde ao Feto, he liso, e muito cheio de Vasos sanguineos, e chama-se lado Fetal; o outro que toca a Madre, he gembroso, formado de muitas glandulas, semilhantes as das esponjas. este lado chama-se Maternal.

P. — Quantas são as Membranas?

R. — Tres: Amnios, Chorion, e Decidua Reflexa. A primeira he mais anterior, e pello que he mais delgada. A segunda fica mais exterior he mais grossa: as duas ficão formando o saco das agoas. A terceira forra o interior da Madre.

P. — De que servem as Membranas?

24.ª R. – Afim de vir [sahir] outra Cri= segd.a
ança; a Madre neste caso
não diminue, porq. m.to pou=
co de volume; fica dura
e as dores de parto continuão.
e q.do ~~[riscado]~~ passão as dores
de parto, a Madre dimi=
nue de volume e fica
m.to molle, e frouxa.
P. – De q. forma se faz a [Secreta]
Com o dedo?
R. – Pela Vagina, e pelo intestino
recto.
P. – Em q. casos se faz pela Vagina.
R. – P.a conhecer a Virgindade;
e aprender da Natureza
o q. é a Madre, e se huma
Mulher tem parido há
tempo, ou de fresco.
P. – Como se conhece a Virgindade
pelo toque do dedo?
6. –

larga e dorida; as suas lugas
pequenas, e as suas tetas; o Orificio
da Madre aberto, froxo, e dorido;
a corrente do sangue ou dos lo-
quios prezente, e hum cheiro
particular a Mulher parida;
e o Ventre ou barriga inxada
com a palma da Mão está fle-
xivel, e as beras dorida, e o Cor-
po da Madre duro. Tambem na
parte Mais baixa do Ventre.

P. — Como conheceremos que a Mulher
está em parto?

R. — Pelas dores dos lombos, e extende-
rem ao Ventre e as Cuxas; pela
dilatação do Orificio da Madre
e pela sahida do Muco, e as vezes
o Saco das aguas apresentado.

P. — Pode-se julgar pela Vista da Vir-
gindade da Mulher?

R. — Pela Vista das partes genitaes -

P. – Pode terminarse a prenhez antes deste tempo?

R. – Pode ser antes: e muitos os partos antes deste tempo se chamão-se abortivos.

P. – Quantas differenças há de partos?

R. – Há quatro: a saber, Natural, Laborioso, Contra-Natural, e Anomalo.

P. – Qual he o Parto natural?

R. – He todo aquelle em q a criança apresenta a cabeça e o parto dura [illegible] horas, e não requer socorro da arte.

P. – Qual he o parto Laborioso?

R. – He o q dura mais de 24 horas, apresentando-se a cabeça e requer socorro da arte.

P. – Qual he o parto Contra natural?

R. – O q apresenta qualq. pe. do corpo q não seja a cabeça, he o parto Contra-

na

3.º Natural.

P. – Qual he o parto anomalo.

R. – He todo aquelle q̃ he acompanhado de hemorragia, de Convulçoens, de duas ou mais Crianças, ou q̃ o cordão Umbilical se apprezenta primeiro, ou adiante da Criança.

P. – Que Variedades de pozições há no parto Natural.

R. – Há quatro a saber: Cranio inclinado p.a o Sacro; face Virada p.a o Pubis, a Cabeça aprezentandoce Com hum, ou ambos os braços, e Vertice aprezentado ao orificio da Madre.

P. – Que Circonstancias se nos offerecem nos primeiros passos.

R. – Sete, a saber: Pancada

32.º P. — Qual he a causa da estranguria na Parturiente?

R. — A estranguria, ou impedim.to da sahida da urina procede da compressaõ da cabeça da criança descida na Bacia comprimindo o pescoço da Bexiga Urinaria, e as vezes causa impedim.to total.

P. — Que se deverá fazer, q.do houver impedim.to total da urina?

R. — Despejar a Bexiga p.a ẽ naõ tardar no parto, o q se faz de duas formas, por posiçaõ horizontal, e por Algalia.

P. — Como se praticaõ estas duas operaçoens?

R. — A posiçaõ horizontal he fazendo deitar de costas, ou de lado a Parturiente a fim de tirar da compressaõ a parte inferior -

prezentada da Criança; então
o pescoço da Bexiga fica livre,
e a urina sahe facilmente.

P. Como se introduz a algalia?

R. Pella Urethra ou Via da urina até
entrar na Bexiga Urinaria.

P. Porq̃ tem as Mulheres diarrea
no parto?

R. Pelo consenso do Utero com os
fincteres do Anus, e pela Compres
ção da Cabeça da Criança so
bre o Intestino Recto; Esta he
util á Parturiente.

P. Pq̃ serve a dis carga do Mu
co da Vagina no parto?

R. Pa humedecer as partes genita
es, Mostrão q̃ estarem dispos
tas e dilatarem-se, e o parto
Comeca.

P. - Continua q̃ he Muco Virió?

R. —

34.ª R. — Aparece o tal Meco com tinto de sangue, o q. se chama marca do parto.

P. — Indica o Meco só c/ o tinto de sangue, parto existente?

R. — Não indica parto existente sem haver dores;

P. — Que coiza he dôr de parto?

R. — He huã contracção uterina feita p.ª expellir a criança

P. — Quantas especies ha de dores?

R. — Verdadeiras, e falças. As verdadeiras começão nos lombos extendendo-se ao ventre, pubis, ha Meco, e dilatação do Orificio da Madre. As dores falças começão nos lombos, extendem-se ao ventre, não ha descarga do Meco, nem dilatação do Orificio da Madre. P.

P. — Quaes são as causas das do-
res falsas.

R. — Cansaço, agitação da alma,
fezes, urinas e Moralez.

P. — Porque modo se tirão as dores
falças?

R. — Se procederem de Cansaço, fa-
zer socegar a Parturiente na
Cama. Se de agitação da al-
ma, socegala por meios de
Conversação que a divirtão. Se
por urina retida, despejala,
como dissemos. Se por fezes retidas
despejalas por mezinhas e Moli-
entes.

P. — Que progresso seguem as dores
verdadeiras.

R. — No principio do parto são
pequenas com intervalos grandes,
no progresso os intervalos pe-
quenos, as dores mto longas. &.

3o. P. Como se conhecem os graos das dores?

R. — Pelo tom da voz mais ou menos forte, e dos Parturientes, tegido o grao das dores, a dilatação do Orificio da Madre e partes genitaes.

P. — Como teremos hua idea mais distincta do parto?

R. — Pelos seus tres estados, a saber: o 1.o inclue todas as circunstancias desde o seu principio a te a Rotura das aguas, ou dianteiras; o 2.o desde a Rotura das aguas ate a sahida da criança: o 3.o desde a sahida da criança, até a sahida da Placenta.

P. — Que circunstancias ocorrem no primeiro estado?

R. — Orificio da Madre esta mais-

Cortados p.a cima e p.a baixo
e q.do em q.do, e de tempo em tempo
Virilhas ao Comprim.to do Cor-
dão até o Centro da Placenta,
afim de Observar adhezida
della; e q.do a Placenta Come-
ca adecair, da Vulva p.ª a palma
da Mão esquerda por baixo
da Placenta e a levantará pu-
xando aomesmo tempo pelo
Cordão Contra os Pubis até
Completa Sahida. Eis aqui
o q se deve fazer nos 3. estados
do parto. Resta agora pôr
a Parida na Cama Com hum
Lançol em dobras Com seu en-
Cerado, ou pelle de Carneiro
no Meio das dobras, e logo a
mesma segure-lhe o ventre

Seja

Concedido Minimo dilatar
o Anus para a saida do meconio,
e Vesti-la.

P. — Porque razão se ata o Cordão umbilical tres polegadas distantes do embigo.

R. — Porque se acontecer que a ligadura, o Corte, há lugar para fazer segunda ligadura: e por esta razão a Parteira tem obrigação indispensavel todos os dias que pentear a criança, de examinar o dito Cordão.

P. — Como se pode Conhecer o parto laborioso?

R. — Pelas suas Causas e sinaes.

P. — Quaes são ellas.

R. — São, a situação irregular da Madre, rigeza das partes, q

do Utro depende do volume dos Contentos, isto he, da duas Crianças, ou da de Maria da quan tid.e das Agoas, e Rigeza das Membra nas.

P. – Que fará a Partr.ª nestes Casos.

R. – No 1.º nada pode fazer: e no 2.º Rom pêr as Membranas, e evacuar as Agoas, logo q a cabeça da Cri ança tem feito na Bacia, e q o Orificio da Madre esta m.to dilatado.

P. – Que fará a Partr.ª qd.º ouver eva cuação imperfeita das Agoas, ou gôta a gôta.

R. – Humedecer as partes genitaes da Parturiente com banha.

P. – Que se deverá fazer toda a vez q a Mulher tiver debilid.e

48.ª R. — Animale com caldos, e com hũa Colher de agoa de canela segd.º o mesmo.

P. — Quando a Parturiente tiver falta de hũ grão de irritabilid.e;

R. — Passear a Parturiente, e animala por caldos, como mais dito.

P. — Que devemos fazer qd.º ouvér desproporção entre a Cabeça da Criança, e Bacia da Parturiente?

R. — Xamar a tempo hábil, o Partr.º

P. — Como conheceremos o parto Contra Natural?

R. — Pela prezentação da Criança, não ser a Cabeça mas sim ser qualquer p.te do Corpo, a saber: hombro, pescoço, Costas, peito, Ventre, ou barriga, maons —

500

Apparently complete:
(1 l.), 48 p., (1 blank l.)
L.D. 5/4/87

8/45